

## Prueba rápida para detectar VIH tiene una efectividad de hasta 98%

Recomiendan la prueba rápida para mujeres embarazadas o que quieran embarazarse, ya que ahora hay tratamientos para que el bebé nazca sano

Las pruebas rápidas para detectar VIH tienen una efectividad por arriba de 98 por ciento. Las probabilidades de que evidencie resultados positivos es más alta en la población que estuvo expuesta a un riesgo mayor de contraer la enfermedad, como haber tenido relaciones sexuales entre hombres o sin usar condón, o el uso de jeringas usadas para inyectarse drogas o tatuarse, afirmó la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la Unidad de VIH del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

Explicó que la prueba no es diagnóstica, por lo que siempre hay que corroborar resultados a través de una prueba confirmatoria, sobre todo en aquellos que no recuerdan haber tenido prácticas de riesgo, ya que los pacientes con problemas hepáticos o de autoinmunidad suelen tener resultados positivos que son falsos.

Existen dos tipos de pruebas rápidas: una es detectar el virus mediante la saliva o a través de una muestra de sangre obtenida por un pinchazo en el dedo. El líquido corporal obtenido se coloca en una tableta de plástico. Una tira reactiva marcará dos líneas rojas en el caso de que el resultado sea positivo y una, en caso de ser negativo. Si no marca nada, quiere decir que es defectuosa y aplicar otra prueba.

Lo que se mide gracias a la prueba rápida son los anticuerpos del paciente, es decir, proteínas que se forman cuando una persona se expone al VIH. Los resultados se obtienen en 20 minutos. Recomendó la prueba rápida para mujeres embarazadas o que quieran embarazarse, ya que actualmente hay tratamientos para que el bebé nazca sano.

La especialista explicó que cuando una persona tiene una práctica de riesgo que la puede llevar a adquirir VIH debe dejar pasar tres meses para hacerse una prueba rápida, ya que hay un periodo llamado “de ventana”, donde no hay los niveles de anticuerpos necesarios contra el virus, por lo que podrían salir los resultados negativos sin serlo.

Las personas que hayan tenido prácticas de riesgo y quieran tener resultados tienen que hacerse una prueba de ELISA (inmunoensayo) de cuarta generación, y los resultados se obtienen en 24 horas.

Las pruebas rápidas para detectar VIH son gratuitas y pueden conseguirse en cualquier centro de salud, en el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (Coesida), en los dos Hospitales Civiles de Guadalajara, en el de Zoquipan, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras. Cabe destacar que hasta el 29 de mayo, de 9:00 a 12:00 horas, en Escorza 169, dentro del Programa de Salud Organizacional y el Área Médica de la Unidad de Trabajo Social, se aplicarán pruebas rápidas de VIH-Sida a los universitarios.

Dijo que hay muchos tratamientos que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. Aseguró

que si la persona recibe tratamiento oportuno, el Sida puede ser controlado al igual que la diabetes y la hipertension; reitero que en Mexico actualmente hay medicinas que pueden evitar que las personas mueran a causa de este sindrome.

## **A T E N T A M E N T E**

**“Piensa y Trabaja”**

**Guadalajara, Jal., 4 de mayo 2015**

**Texto: Martha Eva Loera**

**Fotografía: Internet**

**Etiquetas:**

[Luz Alicia González Hernández](#) [1]

---

**URL Fuente:** <https://comsoc.udg.mx/noticia/prueba-rapida-para-detectar-vih-tiene-una-efectividad-de-hasta-98>

**Links**

[1] <https://comsoc.udg.mx/etiquetas/luz-alicia-gonzalez-hernandez>